

LÍNGUA PORTUGUESA

O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

O tempo: Feroz amigo

É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso, quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.

E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”. Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.

E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente reclamando de tudo e de todos.

Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda... ou ágil, mas ainda lúcido.

Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível, redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.

Fonte: <https://www.50emails.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/>

QUESTÃO 01

É correto afirmar sobre o texto:

- A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase da existência;
- B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
- C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
- D) No termo “eventualmente **lhe** dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.

QUESTÃO 02

Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):

- () “**nem** ela, **nem** ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
- () “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de alguém;
- () “Viver **deveria** ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
- () “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.

A sequência correta, de cima para baixo é:

- A) C, E, C, E;
- B) C, C, E, E;
- C) E, C, E, C;
- D) E, C, E, E.

QUESTÃO 03

Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:

- A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
- B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
- C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
- D) “Cria em si, mas não duvide sempre dos outros.”.

QUESTÃO 04

Leia o texto:

Educação! Educação!

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB com a segunda parte do artigo Educação! Educação!

Passa-me um sabão danado. (...)

– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!

Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”

Sinto um frio na espinha e balbucio:

– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)

Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.

Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:

- I. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
- II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
- III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido de “dar instrução a, transmitir conhecimento a” ele é um **verbo** transitivo direto e indireto;
- IV. “Um dos romances **que** mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.

São corretas somente as afirmativas:

- A) I, II e IV;
- B) II e III;
- C) I, III e IV;
- D) I e III.

QUESTÃO 05

Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:

- A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
- B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo, uniformidade nos documentos;
- C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o Memorando;
- D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

QUESTÃO 06

Segundo a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a afirmativa correta:

- A) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas pelo Ministério da Saúde;
- B) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos;
- C) Os Municípios não poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde;
- D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como investimentos previstos no Plano anual do Ministério da Saúde.

QUESTÃO 07

A Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, instituiu o Pacto pela Vida. A respeito deste tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira;
- II. Entre as prioridades pactuadas estão a saúde do idoso e controle do câncer do colo do útero e da mama;
- III. Entre as metas para o controle do câncer da mama está a ampliação para 100% a cobertura de mamografia, conforme protocolo.

Está(ão) correta(s), apenas a(s) afirmativa(s):

- A) I e II;
- B) I e III;
- C) II;
- D) III.

QUESTÃO 08

A Atenção Básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas possibilidades de viver de modo saudável. Acerca da Atenção Básica, assinale V para verdadeiro ou F para falso:

- () É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde;
- () A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde;
- () O processo de pactuação da Atenção Básica seguirá regulamentação específica do Pacto de Gestão;
- () Para Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da Família em grandes centros urbanos, recomenda-se o parâmetro de uma UBS para até 12 mil habitantes, localizada dentro do território pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, F, F;
- B) V, F, F, V;
- C) F, F, V, V;
- D) V, V, V, F.

QUESTÃO 09

Sobre a Vigilância Sanitária, assinale a afirmativa correta:

- A) Pode ser definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos;
- B) Para se habilitar à gestão descentralizada das ações de vigilância sanitária, os Estados assinaram o Termo de Ajuste, com a aprovação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite;
- C) Dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, apenas ao da esfera federal compete a elaboração de normas que regulamentem o funcionamento dos estabelecimentos que desenvolvem processos produtivos e oferecem serviços à população, dentro de seu campo de abrangência;
- D) A ANVISA constitui-se em uma autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da agricultura e que se caracteriza pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.

QUESTÃO 10

Os Sistemas de Atenção à Saúde são respostas sociais deliberadas às necessidades de saúde dos cidadãos e, como tal, devem operar em total coerência com a situação de saúde das pessoas usuárias. Em relação às Redes de Atenção à Saúde (RASs), analise as afirmativas abaixo:

- I. A organização das RASs, para ser feita de forma efetiva, eficiente e com qualidade, tem de estruturar-se com base nos seguintes fundamentos: economia de escala, disponibilidade de recursos, qualidade e acesso; integração horizontal e vertical; processos de substituição; territórios sanitários; e níveis de atenção;
- II. As RASs têm de incorporar, como um ponto central, o critério do acesso; assim, o desenho das redes de atenção à saúde faz-se combinando, dialeticamente, de um lado, economia de escala e qualidade dos serviços e, de outro, o acesso aos serviços de saúde;
- III. Os processos de substituição são importantes para que se possa alcançar o objetivo das RASs de prestar a Atenção certa, no lugar certo, com o custo certo e no tempo certo;
- IV. Os níveis de Atenção à Saúde são fundamentais para o uso racional dos recursos e para estabelecer o foco gerencial dos entes de governança das RASs.

Estão corretas:

- A) I e III, apenas;
- B) II e IV, apenas;
- C) I, III e IV, apenas;
- D) Todas as afirmativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 11

Sobre a profilaxia da oftalmia neonatal, é correto afirmar:

- A) O povidona a 2,5% apresenta menor toxicidade em relação ao uso do nitrato de prata a 1%;
- B) Teste do reflexo vermelho é a forma adequada de identificação precoce dos descolamentos de retina;
- C) Os prematuros nascidos com peso de nascimento (PN) < 1.500 g e/ou idade gestacional (IG) < 35 semanas e admitidos em uma unidade de tratamento intensivo devem ser examinados, sem midríase medicamentosa, a partir da 6^a semana de vida para o exame de mapeamento de retina em prematuros;
- D) O colírio de eritromicina 0,5% é o mais recomendado para todos os recém-nascido, pois não apresenta conjuntivite química.

QUESTÃO 12

RN pré-termo de 33 semanas apresenta dificuldade respiratória ao nascer com gemidos expiratórios, com piora progressiva em 36 horas, com ausculta com diminuição do murmúrio vesicular. A radiografia de tórax mostrou infiltrado retículo-granular difuso de maneira uniforme e com broncograma aéreo. A respeito deste caso, assinale a opção correta:

- A) É um caso típico de Aspiração de mecônio;
- B) O tratamento com surfactante pulmonar deve ser iniciado nas primeiras horas de vida;
- C) Diagnóstico diferencial importante e que também responde bem em todos os casos ao uso de surfactante é a pneumonia intrauterina;
- D) Hemorragia pulmonar é o diagnóstico mais provável.

QUESTÃO 13

RN a termo, sexo feminino, apresenta dificuldade respiratória, com discreta cianose e que melhora quando chora. Houve dificuldade para passar a SOG. Sobre este possível diagnóstico, analise as afirmativas abaixo:

- I. Esta associado em cerca de 60% com a síndrome CHARGE;
- II. Um teste simples que pode sugerir o diagnóstico é colocar um fragmento de algodão abaixo da narina e este não se movimentará durante a respiração;
- III. A realização da tomografia de seios da face não é útil no diagnóstico;
- IV. Estes pacientes podem vir a se beneficiar de uma chupeta de McGovern ou uma via aérea oral, no curto prazo, para a obtenção da via aérea definitiva.

Estão corretas, apenas:

- A) I e IV;
- B) II e III;
- C) I, II e III;
- D) I, II e IV.

QUESTÃO 14

Acerca da fototerapia, podemos afirmar que:

- A) Quando a bilirrubinemia é superior ao percentil 95 no nomograma de Bhutani, é preferível indicar fototerapia de alta intensidade, de preferência com lâmpadas azuis especiais, para aumentar a irradiância e a superfície corpórea exposta à luz. Nesses casos, deve haver interrupção de exposição do RN ao aparelho se para mamar;
- B) RNs que recebem a luz na parte anterior e posterior do tronco, membros e permanecem sem fraldas recebem maior irradiância espectral. Dessa forma, a fototerapia é mais eficaz quando a irradiância é adequada;
- C) Considera-se a irradiância de 10-15 mW/cm² /nm como convencional e a de 60 mW/cm² / nm, disponível na maior superfície corporal possível, como fototerapia de alta intensidade;
- D) O uso de spot com lâmpada halógena, deve-se tomar especial cuidado com a distância mínima preconizada de 20cm do RN; existe a possibilidade de queimaduras quando instalado a distância inferior.

QUESTÃO 15

A prevenção de encefalopatia bilirrubínica engloba várias intervenções, desde a assistência pré-natal às gestantes Rh (D) negativo, até o acompanhamento da icterícia após a alta hospitalar. Quanto à prevenção da doença hemolítica perinatal por incompatibilidade Rh indicam a administração de imunoglobulina humana anti-D dentro das primeiras 72 horas nas seguintes situações:

- A) Mães Rh (D negativo) sensibilizadas (Coombs direto anti-D negativo) com partos de RN Rh (D positivo) e Coombs indireto negativo;
- B) Pós-abortamento, gravidez ectópica ou mola;
- C) Pós-sangramento durante a gestação, independentemente da idade gestacional, não precisa ser realizado;
- D) Durante a gestação em mulheres Rh (D negativo) e com Coombs direto negativo com o pai do bebê Rh (D positivo) entre a 22^a e a 36^a semanas.

QUESTÃO 16

Ministério da Saúde divulga que os casos de sífilis no Brasil aumentaram 32% de 2017 para 2018. Sobre sífilis congênita, é correto afirmar:

- A) Mães com sífilis primária ou secundária ou com sífilis adquirida nos últimos quatro anos, não tratadas, representam maior risco de prematuridade, morte perinatal (18% – 40%) e infecção congênita (70% – 100%) quando comparadas àquelas com sífilis latente adquirida há mais de quatro anos, em que o risco de infecção congênita é de 23% a 40%;
- B) O risco de infecção fetal e o acometimento da gravidade da doença são independentes da duração da infecção materna;
- C) Os achados laboratoriais menos frequentes na sífilis congênita incluem alterações de enzimas hepáticas;
- D) O teste VDRL negativo no RN exclui a possibilidade de sífilis congênita. Se não há outros elementos sugerindo sífilis congênita, não precisa repetir o teste com intervalo de 30 dias para confirmar a ausência de infecção.

QUESTÃO 17

Assim que o cordão umbilical é cortado, há queda na concentração de alguns aminoácidos no plasma do RN. Esse “choque metabólico” pode desencadear resposta à inanição, na qual a produção endógena de glicose é a manifestação mais importante. A respeito da nutrição parenteral neonatal, é correto afirmar:

- A) A oferta proteica deve ser iniciada no primeiro dia de vida para evitar o estado catabólico. Habitualmente, inicia-se infusão proteica com 1g/kg/dia e aumenta-se diariamente de 0,5 a 1g/kg/dia até o valor máximo desejado, estimado em 3,85g/kg/dia para RN pré-termo entre 700g e 1.000g;
- B) O uso de soluções com cálcio pode causar graves problemas, dentre os quais deslocamento da bilirrubina de sua ligação com a albumina pelos ácidos graxos livres, piora da função pulmonar, aumento do risco de doença pulmonar crônica e interferência com a função imune ou plaquetária;
- C) Zinco, cromo e selênio são excretados pela bile. Seu uso é contraindicado na vigência de colestase com bilirrubina direta maior que 2,0mg/dL;
- D) No caso de RN a termo deve iniciar com aporte calórico total de 28kcal/kg/dia (6g/kg/dia de glicose e 1g/kg/dia de aminoácidos). Monitorizar a glicemia. Aumentar cerca de 1kcal/kg/dia até atingir cerca de 100kcal/kg/dia.

QUESTÃO 18

Em relação ao tratamento da toxoplasmose em neonatos, é correto afirmar:

- A) São utilizadas sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico, deve-se associar prednisona ou prednisolona em todos os casos;
- B) Quando a infecção do feto é confirmada ou altamente suspeita (após resultado positivo na PCR realizada no líquido amniótico ou detecção de anormalidades características na ultrassonografia obstétrica), é indicado o uso da associação de sulfadiazina, pirimetamina e ácido fólico pela mãe para tratamento fetal;
- C) Ácido fólico 10 mg administrados três vezes por semana, a ocorrência de neutropenia: se <2.000 neutrófilos/mm³, aumentar a dose para 20 mg diários durante o tratamento da toxoplasmose congênita durante o primeiro ano de vida;
- D) Sulfadiazina 50 mg/mL, 100 mg/kg/dia divididos em 2 doses diárias, durante 1 ano.

QUESTÃO 19

RN a termo em hidratação venosa apresenta convulsões. Sobre o mais provável distúrbio eletrolítico, é correto afirmar:

- A) A provável causa é a oferta aumentada de sódio;
- B) A dosagem de sódio sérico menor que 110 mEq/L estão associados sinais neurológicos;
- C) Se hiponatremia < 120mEq/L ou sinais neurológicos - furosemida (1mg/Kg EV), enquanto se repõem as perdas de Na com NaCl 3% (corrigir Na para 125mEq/L). Esta estratégia leva a uma perda de água livre, sem alteração do sódio total do corpo;
- D) Perda renal diminuída de sódio: imaturidade tubular renal, uropatia obstrutiva, alcalose metabólica e IRA poliúrica são causas de hiponatremia.

QUESTÃO 20

RN pré-termo realiza ECG sugestivo de distúrbio eletrolítico. A correlação correta é:

- A) Onda T achatada e encurtamento do complexo QRS no caso da hipercalemia;
- B) Depressão do segmento ST e aumento do intervalo PR no caso de hiperpotassemia;
- C) Aparecimento da onda U e bloqueio atrioventricular no caso de hiperpotassemia;
- D) Prolongamento do intervalo QT e taquicardia ventricular no caso de hiperpotassemia.

QUESTÃO 21

A respeito da anemia no período neonatal, analise as afirmativas abaixo:

- I. Em RNs pré-termo, existe um declínio mais rápido e mais pronunciado na hemoglobina após o nascimento do que nos RNs a termo. Esta anemia da prematuridade ocorre tipicamente na 4^a a 6^a semanas de idade;
- II. A anemia da prematuridade resulta, em grande parte, da produção relativamente baixa de EPO, da redução da resposta à EPO, e da coleta de sangue;
- III. A anemia que surge nas primeiras 24 a 72 horas de vida e que não está associada à icterícia significativa é comumente causada por hemorragia no momento do nascimento, ou por uma hemorragia interna pós-natal.

Estão corretas:

- A) I e II, apenas;
- B) II e III, apenas;
- C) I e III, apenas;
- D) I, II e III.

QUESTÃO 22

A correlação correta entre distúrbios congênitos e anomalias cardiovasculares é:

- A) Síndrome de Marfan e bloqueio atrioventricular;
- B) Neurofibromatose tipo I e fibrose pericárdica;
- C) Síndrome de DiGeorge e comunicação intraventricular;
- D) Síndrome de Marfan e prolapso de válvula mitral.

QUESTÃO 23

Acerca das alterações das cardiopatias congênitas, é correto afirmar:

- A) Na CIV pode apresentar na radiografia de tórax aumento da trama vascular pulmonar e área cardíaca normal;
- B) Tanto CIA e CIV podem apresentar aumento da trama arterial pulmonar como cardiomegalia na radiografia de tórax;
- C) Transposição das grandes artérias apresenta desdobramento de B 1 e sopro diastólico contínuo;
- D) No caso de tetralogia de Fallot pode apresentar desdobramento de B2 e sopro sistólico rude quando na presença de atresia pulmonar.

QUESTÃO 24

RN pré-termo, nascido de parto normal, sem intercorrências. Foi observado, após 24 horas de vida, icterícia em zona 2 de Krammer. A tipagem sanguínea da mãe é O positivo e do RN é A positivo. Com base nesse caso, assinale a opção correta:

- A) É necessária a solicitação da dosagem de reticulócitos e hematócrito;
- B) Caso for solicitada a dosagem de reticulócitos e esta estiver diminuída, sugere-se a presença de incompatibilidade Rh;
- C) Se o Coombs direto solicitado vier negativo, exclui a possibilidade de incompatibilidade ABO;
- D) Não deve se tratar de hiperbilirrubinemia não fisiológica, já que nesse caso não há incompatibilidade Rh e ABO.

QUESTÃO 25

A hipertensão pulmonar (HP) é uma causa comum de admissão em UTI neonatais terciárias e está associada a significativa mortalidade e morbidade dos pacientes. Em relação a este tema, é correto afirmar:

- A) Ela é definida com uma pressão na artéria pulmonar média (PAPm) superior a 35 mmHg quando medida por meio de cateterização cardíaca direita, ou uma pressão sistólica máxima na artéria pulmonar superior a 25 mmHg, conforme medida por ecocardiograma;
- B) A cianose central e o desconforto respiratório que têm início logo após o nascimento são as principais características clínicas da síndrome da HP em RNs. A cianose (hipoxemia) completamente resolvida, com a terapia com suplementação de oxigênio e ventilação artificial;
- C) A Hipertensão pulmonar persistente no recém-nascido (HPPRN) é mais comumente secundária a distúrbios da transição pós-natal, tais como asfixia perinatal, síndrome de aspiração de mecônio (SAM), sepse, ou hipoplasia pulmonar;
- D) Entre as causas adquiridas mais comuns de HPPRN leve, deficiência de proteína surfactante e displasia alveolocapilar com desalinhamento das veias pulmonares (DACDVP) são observadas com muita frequência.

